



ANIMOX 500

Υδατοδιαλυτή Σκόνη

100 % διαλυτότητα, σταθερή στον χρόνο.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ANIMOX 500, υδατοδιαλυτή σκόνη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ

100 gr. Σκόνης περιέχουν:
Δραστική ουσία: Αμοξικιλίνη trihydrate 50% w/w κοδονομαί με Αμοξιλίνη 45,7% w/w

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Λοιμώξεις που προκαλούνται από βακτήρια ευαίσθητα στην αμοξικιλίνη και ιδιαίτερα λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, του πεπτικού συστήματος και του Μυριτού.

Χοίροι: αλμονιλόωση, πασπερέλλωση, πνευμονοευμενία, κλυστριδιάσες (τύπος A & C), δερματική σταφυλοκοκκίωση, στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις, κρυφός, καλιβοκτηρίωση.

Κραταραγωγιά αρνίδια: πασπερέλλωση, κολοβακτηρίωση, λοιμώξεις κόρυφας, στρεπτοκοκκικές και σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις, αλμονιλόωση, νεκρωτική εντερίτιδα.

Ινδόνιπτες: πασπερέλλωση.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ

Το Animox 500 χορηγείται με το πόσιμο νερό.

157 γραμμάρια ANIMOX 500 μπορούν να χορηγηθούν στον ετήσι αριθμό πτηνών ανάλογα με τη ηλικία σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΡΑΤΑΡΑΓΩΓΙΑ ΟΡΝΙΘΙΑ		ΩΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ (Το σκόνη που σπένν δεν προστίθεται με αυτόν τον υπολογισμό)	
ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΗΝΩΝ	ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΗΝΩΝ
1	30.000	1	70.000
2	13.000	4	15.000
3	7.500	8	8.000
4	5.500	12	5.000
6	3.000	16	3.800
8	2.000	20	3.000

Χοίροι:

Χορηγείται με το πόσιμο νερό στην ποσότητα των 20 mg αμοξικιλίνης τριυδρικής ανά kg Σ.Β. ημερησίως. Η δόση πρέπει να διασπείρεται και να χορηγείται ανά 12 ώρες για περισσότερο από 5 ημέρες. Οποιαδήποτε άλλη παροχή νερού πρέπει να αποκλείεται κατά την διάρκεια της θεραπείας.

Κραταραγωγιά αρνίδια

Χορηγείται με το πόσιμο νερό, έτσι ώστε να εφορμολογούνται 15 mg τριυδρικής αμοξικιλίνης ανά kg α.β. ανά 48 ώρες για συνολικά 5 ημέρες (3 φορές χορήγηση του Animox 500). 150 g του προϊόντος διαλύονται σε 450 λίτρα νερό.

Το διάλυμα πρέπει να είναι φρέσκο και να απορρίπτεται όταν περάσουν 12 ώρες από την παρασκευή του. Ο όγκος του διαλύματος μπορεί να εφορμολογείται ημερησίως ισοποσοτική θεραπεία για πτηνά συνολικού σωματικού βάρους 5.000 kg (15 mg τριυδρική αμοξικιλίνη ανά kg α.β.). Δηλαδή, παρασκευάζεται το φαρμακείο νερό και χορηγείται στα πτηνά για 12 ώρες. Μετά την παρέλευση των 12 ωρών τυχόν απομεινόμενα ποσότητα φαρμακείου νερού απορρίπτεται. Η θεραπευτική αγωγή, με τον ίδιο τρόπο, επαναλαμβάνεται μετά 48 ώρες για συνολικά 3 φορές.

Ινδόνιπτες

Χορηγείται με το πόσιμο νερό, έτσι ώστε να εφορμολογούνται 15- 20 mg αμοξικιλίνης τριυδρικής ανά kg Σ.Β. ανά 48 ώρες για συνολικά 5 ημέρες. Ο ακριβής όγκος διαλύματος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ημερήσια κατανάλωση νερού και το συνολικό σωματικό βάρος. Οποιαδήποτε άλλη παροχή νερού πρέπει να αποκλείεται κατά την διάρκεια της θεραπείας.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορήγηση από το στόμα μετά από διάλυση στο πόσιμο νερό.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΧΗΣ

Καίως:
Χοίροι: 1 ημέρα.
Κραταραγωγιά αρνίδια: 1 ημέρα.
Ινδόνιπτες: 5 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25° C. Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά.

Η παροχή νερού να διακόπτεται 5 ώρες πριν την έναρξη της θεραπείας. Το νερό που περιέχει το φάρμακο να απορρίπτεται κάθε ημέρα, διάφορα θερμοκρασία, 6 ημέρες. Για να επιτύχει ισοποσοτική κατανομή νερού που περιέχει το φάρμακο, το πτηνό να μην είναι στην διάρκεια της αλλη παρή παροχής νερού κατά την διάρκεια της θεραπείας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ε.Ο.Φ. 67189 / 17-10-2005



Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
"Δ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." - "PHARMAQUA Ο.Ε."
Δ. Σολωμού 28, 14451 Μισοπόρφυρη Αττικής
Τηλ.: 210 2811282-2826678, Fax: 210 2848968
website: www.pharmaqua.gr - E-mail: pharmaqua@hol.gr

Παραγωγός υπεύθυνος για την ασφαλή χρήση των παρτίδων:
DOX-AL ITALIA SPA - VIA MASCAGNI, 6/A 20050 - SULBIATE SUPERIORE (MILAN) ITALY



ANIMOX 500

Αφήστε το να καθεί σε ένα ποτήρι νερό.



100 % διαλυτότητα, σταθερή στον χρόνο.