

Colfive 5,000,000 IU/ml

πυκνό διάλυμα για την παρασκευή πόσιμου διαλύματος για μόσχους, χοίρους, αμνούς, όρνιθες και ινδόρνιθες

Give me five!



Σύνθεση ανά ml: Κολιστίνη (θειική) 5.000.000 IU, βενζυλική αλκοόλη (E1519), 10 mg. Διαυγές πορτοκαλί-καφέ διάλυμα.

Είδη ζώων και ενδείξεις: Βοοειδή (μόσχοι), χοίροι, πρόβατα (αμνοί), όρνιθες και ινδόρνιθες. Θεραπεία και μεταφύλαξη εντερικών λοιμώξεων που προκαλούνται από μη διηθητικά στελέχη *E. Coli*, ευαίσθητα στην κολιστίνη. Η παρουσία της νόσου στο κοπάδι θα πρέπει να τεκμηριώνεται πριν από τη μεταφυλακτική αγωγή.

Αντενδείξεις: Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στην κολιστίνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση ανθεκτικότητας στις πολυμυξίνες. Να μην χρησιμοποιείται σε ίππους, ιδιαίτερα σε πώλους, διότι η κολιστίνη, λόγω μεταβολής στην ισορροπία της γαστρεντερικής μικροχλωρίδας, θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη κολίτιδας οφειλόμενης σε αντιμικροβιακά (κολίτιδα Χ), η οποία σχετίζεται συνήθως με το *Clostridium difficile* και μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρος.

Χρόνος αναμονής: Μόσχοι, αμνοί και χοίροι: κρέας και εδώδιμο ιστοί: 1 ημέρα. - Όρνιθες και ινδόρνιθες: κρέας και εδώδιμο ιστοί: 1 ημέρα, αυγά: Μηδέν ημέρες.

Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος στόχος: Συμπληρωματικά προς τη θεραπεία, θα πρέπει να ακολουθούνται πρακτικές ορθής διαχείρισης και υγιεινής ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος λοίμωξης και να ελέγχεται η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Η κολιστίνη έχει δόσοεξαρτώμενη δράση έναντι αρνητικών κατά Gram βακτηρίων. Έπειτα από χορήγηση από το στόμα, υψηλές συγκεντρώσεις επιτυγχάνονται στον γαστρεντερικό σωλήνα, δηλ. στη θέση στόχο, λόγω της πτωχής απορρόφησης της ουσίας. Αυτοί οι παράγοντες υποδεικνύουν ότι διάρκεια θεραπείας μεγαλύτερη από την υποδεικνυόμενη, η οποία οδηγεί σε περιττή έκθεση, δεν συνιστάται.

Ειδικές προφυλάξεις για τη χορήγηση στα ζώα: Μην χρησιμοποιείτε την κολιστίνη ως υποκατάστατο των ορθών πρακτικών διαχείρισης. Η κολιστίνη χρησιμοποιείται ως τελευταία λύση στην ιατρική ως φάρμακο για ανθρώπινη χρήση για τη θεραπεία λοιμώξεων οι οποίες προκαλούνται από πολυανθεκτικά σε φάρμακα βακτήρια. Προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο δυνητικός κίνδυνος που συσχετίζεται με την ευρεία χρήση της κολιστίνης, η χρήση της θα πρέπει να περιορίζεται στη θεραπεία ή τη θεραπεία και τη μεταφύλαξη ασθενειών, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται προληπτικά. Όποτε είναι δυνατό, η κολιστίνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο βάσει δοκιμασίας ευαισθησίας. Η χρήση του προϊόντος κατ' απόκλιση των οδηγιών που παρέχονται στο φύλλο οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της θεραπείας και σε αύξηση του επιπολασμού των ανθεκτικών στην κολιστίνη βακτηρίων. Στην περίπτωση νεογέννητων ζώων και ζώων με σοβαρές γαστρεντερικές και νεφρικές διαταραχές, η συστηματική έκθεση στην κολιστίνη μπορεί να είναι αυξημένη. Ενδέχεται να παρατηρηθούν νευρικές και νεφροτοξικές μεταβολές.

Ειδικές προφυλάξεις που θα πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν στα ζώα: Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις πολυμυξίνες, όπως η κολιστίνη, πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια κατά το χειρισμό του προϊόντος. Συνιστάται η χρήση γαντιών και προστατευτικών γυαλιών κατά το χειρισμό και τη χορήγηση των δόσεων. Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Σε περίπτωση ακούσιας έκθεσης των ματιών, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια και επιδείξτε στον ιατρό την ετικέτα. Αν εμφανίσετε συμπτώματα μετά από την έκθεση στο προϊόν, όπως δερματικό εξάνθημα, αναζητήστε ιατρική συμβουλή και επιδείξτε στον ιατρό την παρούσα προειδοποίηση. Οίδημα του προσώπου, των χειλιών ή των ματιών ή δυσκολία στην αναπνοή αποτελούν σοβαρότερα συμπτώματα και απαιτούν επείγουσα ιατρική φροντίδα. Πλένετε τα χέρια σας μετά από τη χρήση.

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 100 ml, φιάλη του 1L και των 5 L.

Κτηνιατρική χρήση - διατίθεται με κτηνιατρική συνταγή.

Marketing authorisation holder: aniMedica España, S.L.U. Esmeralda, 19 E-08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spain. Representative of the marketing authorisation holder: Industrial Veterinaria, S.A.

Industrial Veterinaria, S.A.
Animal Health Products

Esmeralda 19, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona - Spain
Tel.: +34 93 470 62 71 / Fax: +34 93 372 75 56
www.invesa.eu



Colfive 5,000,000 IU/ml

πυκνό διάλυμα για την παρασκευή πόσιμου διαλύματος για μόσχους, χοίρους, αμνούς, όρνιθες και ινδόρνιθες



Give me five !



ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ

Δ. Σολωμού 28, 144 51 Μεταμόρφωση - Αθήνα
Τηλ.: 210 2811282, 210 2826678, Fax: 210 2848998
e-mail: pharmaqua@hol.gr, website: www.pharmaqua.gr



Colfive



Το πρόβλημα: *Escherichia coli* Ο σύμμαχος: **Colistin**

- Η *E. Coli* είναι μέρος της φυσιολογικής εντερικής χλωρίδας. Σε καταστάσεις καταπόνησης (που σχετίζονται με ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής, ακατάλληλες θερμοκρασίες, αιφνίδιες αλλαγές στη διατροφή κλπ) τα βακτήρια μπορούν να πολλαπλασιαστούν ταχύτατα.
- Η **διάρροια** είναι ένα από τα συμπτώματα της Κολιβακίλλωσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σηψαιμία και θάνατο.
- Αντιπροσωπεύει ένα **σημαντικό κόστος**, όσον αφορά στη θνησιμότητα, στην επιβράδυνση της ανάπτυξης και στη μείωση της γαλακτοπαραγωγής και της αυγοπαραγωγής.

- Αντιβιοτικό που ανήκει στην ομάδα των Πολυμυξινών, δραστικό ενάντια στα βακτήρια αρνητικά κατά Gram, όπως τα **εντεροβακτηριοειδή** και συγκεκριμένα η *Escherichia coli*.
- **Δοσο-εξαρτώμενη βακτηριοκτόνος** δράση.
- Μετά από χορήγηση από το στόμα, δεν παρατηρούνται προβλήματα τοξικότητας, λόγω **χαμηλής απορρόφησης από το έντερο**.
- Η εμφάνιση **ανθεκτικότητας** στην κολιστίνη είναι **σπάνια**.

Η Πολυμικίνη Ε είναι το άθροισμα **5 πολυπεπτιδίων** (E1, E2, E3, E1-I y E1-7MOA).

Πόσιμο διάλυμα, που περιέχει **5 MIU/ml** colistin (sulfate) = Polymyxin E.

Το έκδοχο περιλαμβάνει ρυθμιστικούς παράγοντες, έτσι ώστε το **pH** να βρίσκεται στο **5**, όπου η δράση της βενζυλικής αλκοόλης (συντηρητικό) να είναι η βέλτιστη, εξασφαλίζοντας έτσι και τη σταθερότητα του προϊόντος.

Colfive

Η διάρκεια θεραπείας είναι από τρεις μέρες το ελάχιστο έως και **5 ημέρες** το μέγιστο.

Ενδείκνεται για τη θεραπεία και τη μεταφύλαξη εντερικών λοιμώξεων, που προκαλούνται από μη-διεισθητικά στελέχη της *E.coli* σε **5 είδη ζώων**: μόσχοι, χοίροι, αμνοί, όρνιθες (ορνίθια κρεοπαραγωγής και αυγοπαραγωγές όρνιθες) και ινδόρνιθες.

Give me five !

5 λόγοι για να χρησιμοποιήσετε το Colfive



Εύκολο στη χρήση
Δεν απαιτείται προδιάλυση, πριν από τη διάλυση στο πόσιμο νερό



Φιλικό στο περιβάλλον
Χάρη στην υψηλή του συγκέντρωση, ελαχιστοποιούμε τις απώλειες σε υλικά συσκευασίας



Μειωμένο κόστος μεταφοράς



Εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης



Πολλά είδη συσκευασίας
Φιάλες των 100 ml, του 1 L και των 5 L

Δοσολογία και χρόνος αναμονής

Χοίροι, αμνοί και μόσχοι

0,2 ml Colfive/ 10 kg σ.β./ ημέρα
επί 3-5 συνεχείς ημέρες

$$\text{Colfive} \left(\frac{\text{ml}}{1000 \text{ L}} \right) = \frac{20 \times (\text{kg σωματικού βάρους})}{(\text{L προσλαμβανόμενου νερού})}$$

Χορήγηση μέσω του πόσιμου νερού και του γάλακτος

Κοτόπουλα και γαλοπούλες

15 ml Colfive/ 1000 kg σ.β./ ημέρα
επί 3-5 συνεχείς ημέρες

$$\text{Colfive} \left(\frac{\text{ml}}{1000 \text{ L}} \right) = \frac{15 \times (\text{kg σωματικού βάρους})}{(\text{L προσλαμβανόμενου νερού})}$$

Χορήγηση μέσω του πόσιμου νερού



Χρόνος αναμονής:
Κρέας: 1 ημέρα
Αυγά: 0 ημέρες