

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ:

# SEMITAN 30%

κόνις για πόσιμο διάλυμα για χορήγηση από το στόμα  
σε πτηνά, χοίρους, σκύλους και γάτες.

## ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

Δ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. "PHARMAQUA"

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ

Δ. Σολωμού 28, Μεταμόρφωση Αττικής, 14451

Τηλ: 2102811282, 2102826678, FAX: 2102848998

## ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ:

UPLAB Ε.Π.Ε.

10ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ

14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

## ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

**SEMITAN 30%**

κόνις για πόσιμο διάλυμα για χορήγηση από το στόμα σε πτηνά, χοίρους, σκύλους και γάτες.

Sulfamonomethoxine Sodium

## ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:

Σύνθεση ανά 100 g:

**Δραστικό συστατικό:**

Sulfamonomethoxine Sodium, 30 g/ 100 g

**Έκδοχα:**

Sucrose, 70g/ 100 g

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Πτηνά, χοίροι, σκύλοι, γάτες.

Το SEMITAN 30% χορηγείται στα αναφερόμενα είδη σε κολοβακτηριδιώσεις, παστεριδιώσεις, στρεπτοκοκκικές και σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις, σαλμονελώσεις, κοκκιδιώσεις (είδη Eimeria και Isospora), τοξοπλάσμωση κ.α. Ειδικότερα το SEMITAN 30 % χορηγείται σε περιστατικά λοιμώδους κόρυζας των πτηνών, ατροφικής ρινίτιδας του χοίρου, κοκκιδιώσεις και γενικά σε βακτηριακές λοιμώξεις (όπως εντερίτιδες) των χοίρων, των πτηνών, του σκύλου και της γάτας, οφειλόμενες σε μικροοργανισμούς ευαίσθητους στη σουλφամονομεθοξίνη.

## ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπεραισθησίας στις σουλφοναμίδες και σε ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια.

## ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Αντιδράσεις υπεραισθησίας, επίδραση στην

μικροχλωρίδα και γαστρεντερικές διαταραχές. Μετά από παρατεταμένη χρήση μπορεί να παρατηρηθούν φωτοευαισθησία, ηπατοκυτταρικός ίκτερος, απλαστική αναιμία, κοκιοκυτταροπενία και θρομβοκυτταροπενία. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

## ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ:

Πτηνά, χοίροι, σκύλοι και γάτες

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Να χορηγείται από το στόμα.

Χοίροι και χοιρίδια:

Γενικά συνιστάται η δοσολογία των 200g (200ppm Sulfamonomethoxine) ανά τόνο τροφής

Ειδικά στα πλαίσια προγράμματος για πρόληψη διάρροιών, πνευμονιών, ατροφικής ρινίτιδας και τοξοπλάσμωσης συνιστάται το ακόλουθο σχήμα:

Στις χοιρομητέρες χορηγείται για διάστημα 2 εβδομάδων προ του αναμενόμενου τοκετού έως 30 ημέρες μετά τον τοκετό (συνολικά 1,5 μήνα) για προστασία των νεογέννητων μέσω του μητρικού γάλακτος.

Στα χοιρίδια χορηγείται από τη στιγμή της έναρξης λήψης τροφής και μέχρι 10 ημέρες μετά τον απογαλακτισμό. (σύνολο 60 ημέρες).

#### Γάτες-Σκύλοι:

1-2g / 10kg σ.β. ημερησίως σε νερό ή σε γάλα για 3-5 ημέρες.

#### Πτηνά

##### Κοκκιδίωση: (Πρόληψη-Θεραπεία)

0,3-0,5Kg σε 1000Kg τροφής ή 0,2-0,3Kg / 1000 λίτρα νερού για 5 συνεχείς ημέρες.

Η πενθήμερη χορήγηση αρχίζει στην ηλικία των 5 ημερών και επαναλαμβάνεται με πενθήμερες χορηγήσεις στην ηλικία των 25 και των 50 ημερών.

##### Λοιμώδης Κόρυζα: (Πρόληψη-Θεραπεία)

0,5-1Kg σε 1000Kg τροφής ή 0,5-2Kg / 1000 λίτρα νερού για 5 συνεχείς ημέρες.

Εφαρμόζεται το ίδιο πενθήμερο πρόγραμμα χορηγήσεων όπως και στην περίπτωση των κοκκιδιάσεων.

#### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ:**

Το φαρμακόχο διάλυμα ή πρόμιγμα συνίσταται να καταναλώνεται αμέσως μετά την παρασκευή του.

#### **ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:**

Χοίροι: Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 4 ημέρες

Πτηνά: Κρέας και εδώδιμο ιστοί: 14 ημέρες

Δεν επιτρέπεται η χρήση σε πτηνά σε περίοδο ωτοκίας, τα οποία παράγουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση.

#### **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:**

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Το προϊόν φυλάσσεται στη συσκευασία του, σε χώρο προστατευμένο από το φως.

Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια σε θερμοκρασία <25°C.

#### **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

##### **Ειδική προειδοποίηση για κάθε είδος στόχος**

Δεν απαιτούνται.

##### **Ειδικές προφυλάξεις για τη χορήγηση στα ζώα**

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στις σουλφοναμίδες και σε ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια.

##### **Προς τον χρήστη**

Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στις σουλφοναμίδες, πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια κατά το χειρισμό του προϊόντος.

Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό.

Σε περίπτωση ακούσιας έκθεσης των ματιών, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια και επιδείξτε στον ιατρό την ετικέτα.

Πλένετε τα χέρια σας μετά από τη χρήση.

#### **Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωτοκία**

Μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια κατά την περίοδο της κύησης και της γαλουχίας.

Να μην χρησιμοποιείται σε πτηνά σε περίοδο ωτοκίας, τα οποία παράγουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση.

#### **Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης**

Δεν αναφέρονται.

#### **Ασυμβατότητες**

Δεν αναφέρονται.

#### **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων. Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμμάτα του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

#### **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

#### **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

Αριθμός άδειας κυκλοφορίας:

14706/ 28-4-1999

Μεγέθη συσκευασίας: 50 g, 100 g και 250 g.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.