

# Curofen 50mg/g

## Φενβενδαζόλη

Πρόμιγμα για φαρμακώχο τροφή για χοίρους και πόσιμη κόνις για χοίρους

Μικρότερες δόσεις για μεγαλύτερα αποτελέσματα



ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ

Δ. Σολωμού 28, 144 51 Μεταμόρφωση - Αθήνα  
Τηλ.: 210 2811282, 210 2826678, Fax: 210 2848998  
e-mail: [pharmaqua.ae@gmail.com](mailto:pharmaqua.ae@gmail.com), website: [www.pharmaqua.gr](http://www.pharmaqua.gr)

# Curofen 50mg/g

**Π α ρ α σ ί τ ω σ η**  
Το κόστος της ασθένειας


**Σε περίπτωση μη αντιμετώπισης**  
σημαντική οικονομική επιβάρυνση  
στον παραγωγό



**Μία δραστική σε αυξημένη συγκέντρωση**

**Παράσιτα Στόχος**

- 1** *Hyostrongylus rubidus*
- 2** *Oesophagostomum* spp.
- 3** *Ascaris suum*
- 4** *Trichuris suis*
- 5** *Metastrongylus apri*



# Μικρότερες δόσεις για μεγαλύτερα αποτελέσματα



## Χαρακτηριστικά της Φενβενδαζόλης

Η φενβενδαζόλη είναι ένα ανθελμινθικό ευρέος φάσματος, το οποίο:

- ⊙ Ανήκει στη βενζιμιδαζολο-καρβαμική ομάδα.
- ⊙ Δρα μέσω δέσμευσης σε βήτα-τουμπουλίνη.
- ⊙ Αναστέλλει τον πολυμερισμό της τουμπουλίνης με μικροσωληνίσκους.
- ⊙ Παρεμβαίνει στο μεταβολισμό της ενέργειας.

## Δοσολογία

**Ατομική θεραπεία** (premix, πόσιμη κόνις): ➔ **1 g Curofen/10 kg Σ.Β.**

**Μαζική θεραπεία** (premix):

- ⊙ Αναπτυσσόμενοι και Παχυνόμενοι χοίροι: ➔ **2 kg Curofen/tn ζωτοφής**
- ⊙ Χοιρομητέρες 150 kg: ➔ **7,5 kg Curofen/tn ζωτοφής**
- ⊙ Χοιρομητέρες 200 kg: ➔ **8 kg Curofen/tn ζωτοφής**

## Χρόνος Αναμονής

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: **6 ημέρες**

## Πλεονεκτήματα του Curofen

- ✓ Ασφαλής θεραπεία
- ✓ Χρήση σε κυοφορούσες και θηλάζουσες χοιρομητέρες
- ✓ Πολλαπλές ενδείξεις
- ✓ Συμπυκνωμένη σύνθεση
- ✓ Ευκολία χορήγησης
- ✓ Γρήγορα αποτελέσματα
- ✓ Βελτίωση των παραγωγικών παραμέτρων χοιρομητέρων και παχυνόμενων



# Curofen

50mg/g

Φενβενδαζόλη



Πρόμιγμα για φαρμακούχο τροφή για χοίρους και πόσιμη κόνις για χοίρους

Μικρότερες δόσεις για μεγαλύτερα αποτελέσματα

**Σύνθεση:** Κάθε g περιέχει: Δραστική ουσία: Φενβενδαζόλη, 50 mg, Έκδοχα: Γλυκόζη μονοϋδρική, Κολλοειδές άνυδρο πυρίτιο.

**Ιδιότητες:** Η φενβενδαζόλη είναι ένα ανθελμινθικό που ανήκει στη βενζιμιδαζολο-καρβαμική ομάδα. Δρα μέσω δέσμευσης σε βήτα-τουμπουλίνη, αναστέλλοντας έτσι τον πολυμερισμό της τουμπουλίνης με μικροσωληνίσκους και εν συνεχεία παρεμβαίνει στον μεταβολισμό της ενέργειας.

**Είδη ζώων και ενδείξεις:** Χοίροι: Για τη θεραπεία ενήλικων και άωρων σταδίων (L4), των ακόλουθων νηματωδών, που είναι ευαίσθητα στη βενζιμιδαζόλη, στο γαστρεντερικό και αναπνευστικό σύστημα των χοίρων: *Hyostrogylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp., *Ascaris suum*, *Trichuris suis*, *Metastrongylus apri*.

**Αντενδείξεις:** Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

**Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα:** Δεν ισχύει.

**Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Δεν είναι γνωστή καμία.

**Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία:** Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κuoφορούσες ή θηλάζουσες χοιρομητέρες.

**Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:** Δεν είναι γνωστή καμία.

**Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Ατομική χορήγηση φαρμακούχου προμίγματος και πόσιμης σκόνης: 5mg φενβενδαζόλης ανά kg Σ.Β. εφάπαξ (ισοδύναμη με 1 g προϊόντος ανά 10kg Σ.Β.). Για τη θεραπεία του *Trichuris suis* συνιστάται η διαίρεση της δόσης και η σταδιακή χορήγηση σε διάστημα 7 ημερών. Μαζική χορήγηση φαρμακούχου προμίγματος: Εφάπαξ (σε μία ημέρα) ή σε διάρκεια 3 ή 7 ημερών. Η χορήγηση της κόνεως σε ισοδύναμα μέρη σε διάρκεια 3 ή 7 ημερών είναι το ίδιο αποτελεσματική όσο μία εφάπαξ δόση σε μία ημέρα. Για τη θεραπεία του *Trichuris suis* συνιστάται η διαίρεση της δόσης και η σταδιακή χορήγηση σε διάστημα 7 ημερών.

© Αναπτυσσόμενοι και παχυνόμενοι χοίροι: 2 kg Curofen/tn ζωτροφής.

© Χοιρομητέρες 150 kg: 7,5 kg Curofen/tn ζωτροφής.

© Χοιρομητέρες 200 kg: 8 kg Curofen/tn ζωτροφής.

Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο για να υπολογίσετε πόσο Curofen 50 mg/g πρέπει να προσθέσετε ανά τόνο ζωτροφής:

$$\frac{[0,1 \text{ g}^* \text{ Curofen 50 mg/g} / \text{αριθμός ημερών χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής}] \times \text{Μέσο σωματικό βάρος (σε kg) των ζώων που λαμβάνουν την αγωγή}}{\text{Μέση ημερήσια πρόσληψη ζωτροφής (kg)}} = \text{kg Curofen / τόνο}$$

**Υπερδοσολογία:** Δεν είναι γνωστή καμία.

**Χρόνος Αναμονής:** Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 6 ημέρες.

**Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος:** Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος. Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη για να το προστατεύσετε από το φως. Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα μετά την ένδειξη "EXP". Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

**Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας:** 28 ημέρες.

**Διάρκεια ζωής μετά την ενσωμάτωσή του στην τροφή ή σε σύμπηκτα:** 1 μήνας.

**Να χορηγείται μόνο με κτηνιατρική συνταγή.**

**Συσκευασίες:** premix: 4 kg, πόσιμη κόνις: 1 kg.

