

DUOCYCLINE 500 g/kg

Διυδρική Οξυτετρακυκλίνη

Υδατοδιαλυτή σκόνη για ορνίθια κρεοπαραγωγής και ινδόρνιαθες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για τον έλεγχο των λοιμώξεων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στις τετρακυκλίνες.

- ✓ Αναπνευστικές λοιμώξεις
- ✓ Γαστρεντερικές λοιμώξεις
- ✓ Λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

- Ορνίθια κρεοπαραγωγής: 40-70 mg Οξυτετρακυκλίνης/kg ΣΒ, ισοδύναμο με 60-140 g προϊόντος ανά 100 lit πόσιμου νερού.
- Ινδόρνιαθες: 50-70 mg Οξυτετρακυκλίνης/kg ΣΒ, ισοδύναμο με 50-120 g προϊόντος ανά 100 lit πόσιμου νερού, εξαρτώμενο από την ηλικία, το βάρος και την κατανάλωση νερού.

Το φάρμακο θα πρέπει να χορηγείται διαλυμένο στο πόσιμο νερό ή σε υγρή τροφή, επί 3-5 ημέρες.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:

- Ορνίθια κρεοπαραγωγής: 5 ημέρες
- Ινδόρνιαθες: 9 ημέρες

*Δεν επιτρέπεται η χρήση σε πτηνά, τα οποία παράγουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε δύο μεγέθη συσκευασίας:

- Φάκελος των 100 g.
- Σάκος 1 kg.

