

# DOXYCYCLINE 50% VMD

## Δοξυκυκλίνη

Κόνις για χρήση με πόσιμο νερό/υποκατάστατο γάλακτος για μόσχους, χοίρους και όρνιθες.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μόσχοι πριν την έναρξη του μηρυκασμού:

- ❖ Βρογχοπνευμονία και πλευροπνευμονία που προκαλούνται από *Pasteurella* spp., *Streptococcus* spp., *Trueperella pyogenes*, *Histophilus somni*, *Mycoplasma* spp.

Χοίροι:

- ❖ Ατροφική ρινίτιδα οφειλόμενη σε *Pasteurella multocida* και *Bordetella bronchiseptica*.
- ❖ Βρογχοπνευμονία που προκαλείται από *Pasteurella multocida*, *Streptococcus suis* και *Mycoplasma hyorhinis*.
- ❖ Πλευροπνευμονία οφειλόμενη σε *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

Όρνιθες:

- ❖ Αναπνευστικές λοιμώξεις από *Mycoplasma* spp., *Escherichia coli*, *Haemophilus paragallinarum* και *Bordetella avium*.
- ❖ Εντερίτιδα οφειλόμενη σε *Clostridium perfringens* και *Clostridium colinum*.

### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

- Μόσχοι: 10 mg δοξυκυκλίνης/kg ΣΒ (ισοδύναμη με 20 mg προϊόντος/kg ΣΒ) για 3-5 ημέρες.
- Χοίροι: 10 mg δοξυκυκλίνης/kg ΣΒ (ισοδύναμη με 20 mg προϊόντος/kg ΣΒ) για 3-5 ημέρες.
- Όρνιθες: 25 mg δοξυκυκλίνης/kg ΣΒ (ισοδύναμη με 50 mg προϊόντος/kg ΣΒ) για 3-5 ημέρες.

### ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:

- Μόσχοι: 7 ημέρες
- Χοίροι: 8 ημέρες
- Όρνιθες: 5 ημέρες

\*Δεν επιτρέπεται η χρήση σε πτηνά, τα οποία παράγουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικό περιέκτη του 1 kg.



Τοπικός Αντιπρόσωπος: PHARMAQUA A.E, Σολωμού 28, 14451, Μεταμόρφωση Αττικής, Τηλ: 210 2811282, 210 2826678, Fax: 210 2848998, e-mail: [pharmaqua@hol.gr](mailto:pharmaqua@hol.gr), website: [www.pharmaqua.gr](http://www.pharmaqua.gr)