

# SEMITAN 30%



Sulfamonomethoxine  
Sodium



Κόνις για πόσιμο διάλυμα για χορήγηση από το στόμα σε πτηνά, χοίρους, σκύλους και γάτες.

Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα με πολλαπλές ενδείξεις.



  
**PHARMAQUA**

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ

Δ. Σολωμού 28, 144 51 Μεταμόρφωση - Αθήνα

Τηλ.: 210 2811282, 210 2826678, Fax: 210 2848998

e-mail: [pharmaqua.ae@gmail.com](mailto:pharmaqua.ae@gmail.com), website: [www.pharmaqua.gr](http://www.pharmaqua.gr)





## Δοσολογία

### Πτηνά

► **Κοκκιδίωση (Πρόληψη-Θεραπεία)** → 0,3-0,5 kg /1000 kg τροφής ή 0,2-0,3 kg /1000 lt νερού για 5 συνεχείς ημέρες στις ηλικίες των 5 ημερών, των 25 ημερών και των 50 ημερών.

► **Λοιμώδης Κόρυζα (Πρόληψη-Θεραπεία)** → 0,5-1 kg /1000 kg τροφής ή 0,5-2 kg /1000 lt νερού για 5 συνεχείς ημέρες στις ηλικίες των 5 ημερών, των 25 ημερών και των 50 ημερών.

**Χοίροι** (Ειδικά στα πλαίσια προγράμματος για πρόληψη διαρροιών, πνευμονιών, ατροφικής ρινίτιδας και τοξοπλάσμωσης).

► **Χοιρομητέρες** → 200 g (200 ppm Sulfamonomethoxine)/tn τροφής για διάστημα 2 εβδομάδων προ του αναμενόμενου τοκετού έως 30 ημέρες μετά τον τοκετό (συνολικά 1,5 μήνα).

► **Χοιρίδια** → 200 g (200 ppm Sulfamonomethoxine)/tn τροφής από τη στιγμή της έναρξης λήψης τροφής και μέχρι 10 ημέρες μετά τον απογαλακτισμό. (σύνολο 60 ημέρες).

### Σκύλος - Γάτα

► 1-2 g /10 kg Σ.Β. /ημέρα σε νερό ή σε γάλα για 3-5 ημέρες.

## Χρόνος Αναμονής

► **Χοίροι:** Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 4 ημέρες.

► **Πτηνά:** Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 14 ημέρες.

\*Δεν επιτρέπεται η χρήση σε πτηνά σε περίοδο ωοτοκίας, τα οποία παράγουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση.

**Να χορηγείται μόνο με κτηνιατρική συνταγή.**

**Συσκευασία:** Κουτί με 10 φακέλους των 50 g.

## Ενδείξεις

Σε λοιμώξεις των πτηνών, των χοίρων, του σκύλου και της γάτας, οφειλόμενες σε μικροοργανισμούς ευαίσθητους στη σουλφαμονομεθοξίνη.

- Βακτηριακές λοιμώξεις (όπως εντερίτιδες).
- Κολοβακτηριδιώσεις.
- Σαλμονελλώσεις.
- Παστεριδιώσεις.
- Στρεπτοκοκκικές και σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις.
- Κοκκιδιώσεις (*Eimeria* sp., *Isospora* sp.).
- Τοξοπλάσμωση.
- Λοιμώδης κόρυζα των πτηνών.
- Ατροφική ρινίτιδα του χοίρου.

## Πλεονεκτήματα

- ✓ Η ιδανική λύση για τη Λοιμώδη Κόρυζα.
- ✓ Αντιμικροβιακό ευρέος φάσματος.
- ✓ Δραστικό έναντι ανθεκτικών ειδών κοκκιδίων.
- ✓ Ισχυρή και παρατεταμένη δράση.
- ✓ Συνιστάται για πρόληψη και θεραπεία.
- ✓ Πολλαπλά είδη ζώων στόχοι.
- ✓ Πολλαπλές ενδείξεις.
- ✓ Άριστη διαλυτότητα στο νερό.
- ✓ Ασφαλής και εύκολη χορήγηση.
- ✓ Ασφαλής χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία.
- ✓ Ταχεία ανάρρωση.
- ✓ Βελτίωση των αποδόσεων.

