Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ-ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ:
Curpan, 50 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για πρόβατα

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Δ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. "PHARMAQUA Ο.Ε."
Δ. Σολωμού 28,
144 51 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ. 210 2811282
Email: info@pharmaqua.gr

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
Univet Ltd.
Tullyvin
Cootehill
Cavan
Ireland

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Curpan, 50 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για πρόβατα
Φενβενδαζόλη

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό(ά) συστατικό(ά):

Fenbendazole	50 mg/ml

Έκδοχα:

Methyl Parahydroxybenzoate (E218)	2,0 mg/ml
Propyl Parahydroxybenzoate (E216)	0,2 mg/ml
Sodium Metabisulphite	1,0 mg/ml

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Ανθελμινθικό ευρέος φάσματος για τον έλεγχο των άωρων και ενήλικων μορφών των γαστρεντερικών νηματωδών παρασίτων και των παρασίτων των πνευμόνων των προβάτων.
Για τη θεραπεία των προβάτων που είναι μολυσμένα με ευαίσθητα στις βενζιμιδαζόλες:

Haemonchus spp.
Ostertagia spp.
Trichostrongylus spp.
Cooperia spp.
Nematodirus spp.
Bunostomum spp.
Chabertia spp.
Strongyloides spp.
Oesophagostomum spp.
Dictyocaulus filaria
Το φάρμακο είναι συνήθως αποτελεσματικό κατά της Moniezia spp. από τις ταινίες και έχει ποικίλη αποτελεσματικότητα κατά του Trichuris spp. των προβάτων.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Δεν έχουν αναφερθεί.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Πρόβατα.

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Για τη χορήγηση από το στόμα σε πρόβατα. Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση, Η συνιστώμενη θεραπευτική δόση της Fenbendazole είναι 5 mg/kg (περίπου 1 ml ανά 10 kg σωματικού βάρους) για τα πρόβατα.
Υπολογίστε το σωματικό βάρος προσεκτικά.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Για τη χορήγηση από το στόμα σε πρόβατα.
Υπολογίστε το σωματικό βάρος προσεκτικά.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 10 ημέρες
Γάλα: 192 ώρες (8 ημέρες ή 16 αμέλξεις)

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Μην καταψύχετε.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)
Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Όταν χορηγείται στα πρόβατα, θα πρέπει να δίδεται προσοχή ώστε να μην τραυματιστεί η στοματική ή η φαρυγγική κοιλότητα με τη συσκευή χορήγησης.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων. Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Φιάλη του 1 l

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ-ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ:
Curpan, 50 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για πρόβατα

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Δ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. "PHARMAQUA Ο.Ε."
Δ. Σολωμού 28,
144 51 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ. 210 2811282
Email: pharmaqua.hol.gr

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
Univet Ltd.
Tullyvin
Cootehill
Cavan
Ireland

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Curpan, 50 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για πρόβατα
Φενβενδαζόλη

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κάθε ml περιέχει:
Δραστικό(ά) συστατικό(ά):

Fenbendazole	50 mg/ml

Έκδοχα:

Methyl Parahydroxybenzoate (E218)	2,0 mg/ml
Propyl Parahydroxybenzoate (E216)	0,2 mg/ml
Sodium Metabisulphite	1,0 mg/ml

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Ανθελμινθικό ευρέος φάσματος για τον έλεγχο των άωρων και ενήλικων μορφών των γαστρεντερικών νηματωδών παρασίτων και των παρασίτων των πνευμόνων των προβάτων.
Για τη θεραπεία των προβάτων που είναι μολυσμένα με ευαίσθητα στις βενζιμιδαζόλες:

Haemonchus spp.
Ostertagia spp.
Trichostrongylus spp.
Cooperia spp.
Nematodirus spp.
Bunostomum spp.
Chabertia spp.
Strongyloides spp.
Oesophagostomum spp.
Dictyocaulus filaria
Το φάρμακο είναι συνήθως αποτελεσματικό κατά της Moniezia spp. από τις ταινίες και έχει ποικίλη αποτελεσματικότητα κατά του Trichuris spp. των προβάτων.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Πρόβατα.

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για τη χορήγηση από το στόμα σε πρόβατα. Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση, Η συνιστώμενη θεραπευτική δόση της Fenbendazole είναι 5 mg/kg (περίπου 1 ml ανά 10 kg σωματικού βάρους) για τα πρόβατα.
Υπολογίστε το σωματικό βάρος προσεκτικά.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Για τη χορήγηση από το στόμα σε πρόβατα.
Υπολογίστε το σωματικό βάρος προσεκτικά.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 10 ημέρες
Γάλα: 192 ώρες (8 ημέρες ή 16 αμέλξεις)

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Μην καταψύχετε.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:
Όταν χορηγείται στα πρόβατα, θα πρέπει να δίδεται προσοχή ώστε να μην τραυματιστεί η στοματική ή η φαρυγγική κοιλότητα με τη συσκευή χορήγησης.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων. Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φιάλη του 1 l
Φιάλη των 2,5 l
Φιάλη των 5 l.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.