

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ- ΕΤΙΚΕΤΑ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ- ΕΤΙΚΕΤΑ:

Doxysol, 200 g/ Kg, κόνις για πόσιμο διάλυμα, για παχυνόμενους χοίρους

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

“PHARMAQUA”, Δ. Κόκκορης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Δ. Σολωμού 28, Μεταμόρφωση Αττικής

Τηλ: 210 2811282- 210 2826678

Φαξ: 210 2848998

email: pharmaqua.ae@gmail.com

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

DOX-AL ITALIA SPA

VIA MASCAGNI, 6/A

20050

SULBIATE SUPERIORE (MILAN)

ITALY

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Doxysol, 200 g/ Kg, κόνις για πόσιμο διάλυμα, για παχυνόμενους χοίρους.

Υδροχλωρική δοξυκυκλίνη.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1 Kg του προϊόντος περιέχει:

Δραστική ουσία:

DOXYCYCLINE HYDROCHLORIDE 200,00 G

Έκδοχα:

Anhydrous citric acid

Anhydrous dextrose

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Λοιμώξεις που προκαλούνται από Gram- θετικά και Gram- αρνητικά βακτήρια ευαίσθητα στην δοξυκυκλίνη, (όπως για παράδειγμα *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*, *Haemophilus pleuropneumoniae*, *Streptococcus suis* type 2, *Streptococcus* spp., *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Lawsonia intracellularis*, *Brachyspira hyodysenteriae*, *Brachyspira pilosicoli*) σε βρογχίτιδες, βρογχοπνευμονίες, βακτηριακές επιπλοκές των αναπνευστικών ιώσεων, παστερέλλωση, γαστρεντερίτιδα, εντερίτιδα, κολιβακίλλωση, σηπτική πολυαρθρίτιδα, οξεία και υποξεία μητρίτιδα και μαστίτιδα.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό, ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πιθανό να παρουσιαστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Χοίροι (παχυνόμενοι).

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Παχυνόμενοι χοίροι: 0,5 g Doxysol ανά 10 kg σωματικού βάρους (δηλαδή 10 mg δραστικής ουσίας /kg σωματικού βάρους) μία φορά την ημέρα επί 5 ημέρες (που αντιστοιχεί σε 140 g προϊόντος/ 100 λίτρα πόσιμου νερού).

Για να εξασφαλιστεί η πλήρης κατανάλωση του φαρμακούχου νερού, τα ζώα δε θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε άλλες πηγές νερού κατά την περίοδο της θεραπείας.

Χρησιμοποιήστε το διάλυμα μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμία.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί (παχυνόμενοι χοίροι): 21 ημέρες.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.

Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλεισμένο.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 30 ημέρες.

Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες: 24 ώρες.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος ζώου:

Κατά την περίοδο της από του στόματος χορήγησης της δοξυκυκλίνης, αποφύγετε την ταυτόχρονη χορήγηση μετάλλων ή προϊόντων που περιέχουν ιόντα, όπως τα ιόντα ασβεστίου, ή μαγνησίου και υιοθετήστε ένα πρόγραμμα διατροφής φτωχό σε δισθενή κατιόντα, ώστε να αποφύγετε τον σχηματισμό μη απορροφήσιμων συμπλόκων.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

Εφόσον ακολουθούνται οι συνήθεις πρακτικές προετοιμασίας και χορήγησης του φαρμάκου, δεν απαιτούνται συγκεκριμένες προφυλάξεις για τον χειριστή. Παρόλα αυτά, είναι ορθό να αποφεύγετε την εισπνοή και την άμεση επαφή. Συστήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά το χειρισμό. Πλύνετε τα χέρια σας μετά από τη χρήση. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση εμμένου ερεθισμού, καλέστε ιατρό. Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στη δοξυκυκλίνη ή στις τετρακυκλίνες θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό προϊόν.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων. Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:3690/16-1-2013

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση. Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Παρτίδα> <Μέρος> {αριθμός}

<ΛΗΞΗ {μήνας/έτος}>