

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ- ΕΤΙΚΕΤΑ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:

Vitachlor 100, 100 mg/g, φαρμακούχο πρόμιγμα για χοίρους και ορνίθια κρεοπαραγωγής

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Δ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. "PHARMAQUA"

Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 28

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

14451

ΤΗΛ:2102811282-2102826678

FAX:2102848998

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

Dox- al Italia S.p.A.

Via Mascagni 6a -20884

Sulbiate Superiore

Milan

Ιταλία

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Vitachlor 100, 100 mg/g, πρόμιγμα για φαρμακούχο τροφή για χοίρους και ορνίθια κρεοπαραγωγής
Υδροχλωρική Χλωροτετρακυκλίνη

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κάθε g του προϊόντος περιέχει:

Δραστικό συστατικό:

Chlortetracycline Hydrochloride 100 mg

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΧΟΙΡΟΙ : Για την πρόληψη και θεραπεία των αναπνευστικών λοιμώξεων, όπως ατροφική ρινίτιδα, πνευμονική παστεριδίωση και ενζωτική πνευμονία. Για την πρόληψη και θεραπεία λοιμώξεων του πεπτικού συστήματος, όπως βακτηριακή εντερίτιδα, κολοβακτηριδίωση και σαλμονέλλωση. Επίσης, για τον έλεγχο των δευτερογενών βακτηριακών λοιμώξεων, που συνοδεύουν ιογενείς λοιμώξεις.

ΟΡΝΙΘΙΑ: Για την πρόληψη και θεραπεία της Χ.Α.Ν., της κολοβακτηριακής σηψαιμίας, της παστεριδίωσης, της λοιμώδους κόρυζας, της λοιμώδους θυλακίτιδας, του τύφου, της αρθρίτιδας βακτηριακής αιτιολογίας και των δευτερογενών βακτηριακών μολύνσεων, που συνοδεύουν τη λοιμώδη βρογχίτιδα, τη λαρυγγοτραχείτιδα, τη νόσο του Newcastle (ψευδοπανώλης) και τις κοκκιδιώσεις.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό, ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η χρήση τετρακυκλινών κατά την περίοδο της της προχωρημένης εγκυμοσύνης ή της ανάπτυξης της οδοντοφυΐας των ζώων και της προχωρημένης εγκυμοσύνης μπορεί να προκαλέσει δυσχρωματισμό των δοντιών των νεαρών ζώων.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες)

- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη ((περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσωκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Χοίροι και ορνίθια κρεοπαραγωγής.

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το VITACHLOR 100 αναμειγνύεται στη ζωοτροφή των χοίρων και των ορνιθίων κρεοπαραγωγής στις ακόλουθες ποσότητες:

Χοίροι: 15mg υδροχλωρικής χλωροτετρακυκλίνης ανά kg/σ.β, δηλαδή, 4 kg προμίσματος / τόνο τροφής (χορήγηση έως επί 15 ημέρες).

ορνίθια : 30 mg υδροχλωρικής χλωροτετρακυκλίνης ανά kg/σ.β., δηλαδή, 4-5 kg προμίσματος / τόνο τροφής (χορήγηση έως επί 5 ημέρες).

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Να μη χρησιμοποιείται το Vitachlor 100, εάν παρατηρήσετε ορατά σημεία αλλοίωσης.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Χοίροι:

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 6 ημέρες

Ορνίθια κρεοπαραγωγής

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 2 ημέρες

Δεν επιτρέπεται η χρήση σε πτηνά τα οποία παράγουν ή πρόκειται να παράξουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

Να φυλάσσεται προστατευμένο από το φως.

Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 18 μήνες

Διάρκεια ζωής μετά την ενσωμάτωσή του στη τροφή ή σε υπό μορφή συμπλήκτων: 3 μήνες

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Καμία

Εγκυμοσύνη και γαλουχία

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Ωτοτοκία:

Να μην χρησιμοποιηθεί σε πτηνά σε περίοδο ωοτοκίας

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:

Μεγαλύτερη αναλογία από 1% ασβέστιο στο σιτηρέσιο μειώνει αισθητά τη δράση των τετρακυκλινών εξ αιτίας της ιδιότητάς τους να δημιουργούν σύμπλοκα με δισθενή κατιόντα.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):

Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σάκος των 25 Kg.

A.A.K. E.O.Φ.: